

Uji Plagiasi Jurnal "Daya Kecambah dan Kekuatan Tumbuh Benih Kakao (Theobroma cacao L.) pada Berbagai Media Simpan"

by Adi Kurnadi

Submission date: 11-Apr-2020 03:00AM (UTC+0800)

Submission ID: 1294620426

File name: April_2020_yulistiati_nengsih_jurnal_edit_2.docx (272.69K)

Word count: 2635

Character count: 15957

Daya Kecambah dan Kekuatan Tumbuh Benih Kakao (*Theobroma cacao* L.) pada Berbagai Media Simpan

Yulistiaati Nengsih^{1*} dan Yuza Defitri¹ Trisna Levia²,

¹ Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Batanghari

² Alumni Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Batanghari

Jl. Slamet Riyadi-Broni-Jambi, 36122 Telp. +62074160103

*email korespondensi: nyulistiaati@yahoo.com

ABSTRAK

Cocoa seeds are recalcitrant seeds that contain high water content that are sensitive to decreased viability to death if stored for long periods of time. The main problem in storing recalcitrant seeds is that they cannot be dried below the critical moisture content, are easy to germinate, and are not tolerant of low sushu, so that the right containers and media are needed to store the seeds. This study aims to obtain suitable media in storage of cacao (*Theobroma cacao* L.) seeds in maintaining seed viability. This study uses a Completely Randomized Design (CRD) method with one treatment factor, namely the use of different storage media with 4 levels, namely (P1) sawdust media, (P2) cocopeat media, (P3) charcoal media at once, and (P4) powder media wood charcoal, each level was repeated 3 times so that there were 12 trial lots, each lot containing 40 cacao seeds with a total of 480 cacao seeds. Variables observed were: storage media water content, seed water content, percentage of seedling capacity in storage, moldy seed percentage, mushroom identification, percentage of seedling capacity, sprout length, and speed of contamination. To see the effect of the treatment carried out F test, then continued with Duncan test at α level of 5%. The result showed that the treatment of rice husk charcoal media had a significant effect on the length of the sprouts and the speed of contamination after storage, and the fungus identified during storage was *Aspergillus* spp.

Keywords: Recalcitrant, seed moisture content, viability.

ABSTRAK

Benih kakao tergolong benih rekalsitran dengan kadar air tinggi dan peka terhadap penurunan kadar air. Daya tumbuh cepat menurun sampai benih tersebut mati dalam penyimpanan. Penurunan kadar air di bawah titik kritis merupakan masalah, benih mudah berkecambah, dan mati bila disimpan pada suhu rendah. Adanya media simpan yang baik diharapkan benih dapat disimpan lebih lama serta mempertahankan daya kecambah dan kekuatan tumbuh benih. Penelitian bertujuan mendapatkan media yang tepat untuk penyimpanan benih kakao dan secara bersamaan mempertahankan daya kecambah dan kekuatannya. Penelitian ini menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan satu faktor perlakuan yaitu penggunaan media simpan yang berbeda dengan 4 jenis media yaitu serbuk gergaji (P₁), cocopeat (P₂), sekam padi (P₃), dan serbuk arang kayu (P₄), setiap jenis media diulang sebanyak 3 kali sehingga terdapat 12 petak percobaan yang masing-masing berisi 40 benih kakao. Peubah yang diamati adalah : kadar air media simpan, kadar air benih, persentase daya kecambah dalam penyimpanan, persentase benih berjamur, identifikasi jamur, persentase daya kecambah, kecepatan berkecambah, dan panjang kecambah. Data hasil pengamatan dianalisis dengan uji F dan dilanjutkan uji Duncan pada taraf α 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media arang sekam padi dapat mempertahankan kualitas

benih kakao dengan indikator benih berjamur selama 12 hari penyimpanan sebesar 0,92%. Setelah 12 hari disimpan, daya kecambah sebesar 64,20%, kecepatan berkecambah 2,1 etmal⁻¹, dan panjang kecambah 6,82 cm. Jamur yang teridentifikasi selama penyimpanan adalah jamur *Aspergillus*. spp.

Kata kunci : kadar air benih, rekalsitran, viabilitas,.

16

PENDAHULUAN

Kakao (*Theobroma cacao* L) merupakan salah satu komoditi yang memberikan devisa yang besar bagi Negara yang menempati posisi nomor 3 setelah kelapa sawit dan karet. Di tingkat pekebun, kakao merupakan sumber pendapatan yang penting, baik sebagai tanaman utama maupun tanaman sela (Rahardjo, 2011).

Pembangunan kebun kakao untuk tanaman baru atau mengganti tanaman tua dan rusak terus dilakukan. Permintaan benih kakao yang akan digunakan sebagai batang bawah ataupun bibit generatif meningkat sejalan dengan perkembangan pembangunan kebun. Harga biji kakao kering di tingkat petani yang cukup bagus, mendorong pekebun untuk meningkatkan luas tanam dan melakukan peremajaan tanaman. Pembangunan kebun baru dan mengganti tanaman tua memerlukan benih kakao yang berkualitas dan mencukupi.

Benih kakao yang tergolong benih rekalsitran sehingga diperlukan kondisi penyimpanan yang dapat mempertahankan kadar air benih agar tidak turun di bawah titik kritisnya. Menurut Kustantini dan Kusumastuti (2015) bahwa mempertahankan kualitas benih saat memasuki masa simpan merupakan sesuatu yang penting sehingga benih dapat ditransporasikan dengan aman. Permasalahan penyimpanan benih kakao adalah kadar airnya tidak dapat diturunkan di bawah kadar air kritis, tidak toleran terhadap suhu rendah dan mudah berkecambah. Mempertahankan kualitas benih tetap prima saat benih tersebut akan disemaikan merupakan target dari penyimpanan benih.

Pemilihan media penyimpanan yang tepat untuk mempertahankan kelembaban benih kakao selama penyimpanan merupakan upaya yang penting untuk mempertahankan daya berkecambah dan kekuatan tumbuh benih. Menurut Syaiful, Ishak, dan Jusriana (2007), serbuk gergaji, dan sekam padi merupakan media simpan yang tepat untuk benih rekalsitran.

Pelindung media penyimpanan juga memberikan pengaruh terhadap kualitas benih rekalsitran saat penyimpanan. Kardus bisa menjadi kemasan yang fungsional, murah, dan dapat didaur ulang. Kardus memberikan situasi yang tahan guncangan sehingga kondisi benih tetap aman (Klimchuk dan Krasovec 2006). Pengemasan juga berfungsi untuk menekan penguapan dan juga cukup untuk menahan kelembaban. Untuk itu kardus bahan pengemas sebaiknya berventilasi sehingga tercipta aerasi yang baik di sekitar benih. Menyimpan benih kakao tanpa aerasi dapat menurunkan kualitas benih. Hasil penelitian Nengsih (2018), menunjukkan bahwa benih kakao yang disimpan di dalam kardus berventilasi 8% dengan menggunakan media cocopeat dapat menahan serangan jamur 17,19% selama 12 hari penyimpanan. Penggunaan kardus berventilasi 8% dengan media simpan cocopeat dapat mempertahankan viabilitas benih. Sumampau (2011) penggunaan media simpan serbuk gergaji dapat mempertahankan daya kecambah benih kakao sebesar 93,33%. Menurut Raharjo (2012) penggunaan arang sekam padi dapat mempertahankan daya kecambah benih kakao 85 - 98% dengan lama penyimpanan 3 minggu. Winiariyasti (2015), menyatakan bahwa benih kakao yang disimpan dengan menggunakan serbuk arang kayu mampu mempertahankan viabilitas benih selama 2 minggu. Hasil-hasil penelitian yang telah dikemukakan

memunculkan peluang untuk menentukan media simpan apa yang lebih baik bila dilakukan secara bersamaan dan pada lingkungan yang sama.

METODOLOGI PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian di Laboratorium Dasar Fakultas Pertanian Universitas Batanghari Jambi dari 16 Januari sampai 26 April 2019. Bahan yang digunakan adalah buah kakao varietas lindak dari perkebunan rakyat di Kecamatan Kumpoh Muaro Jambi, kardus berukuran 23,5 x 15 x 11, media *cocopeat*, serbuk gergaji, arang sekam padi, serbuk arang kayu, abu gosok, plastik bening, bak perkecambahan (tray), air, aquadest, dan fungisida Dithane M-45. Alat-alat yang digunakan adalah timbangan analitik, pelobang kertas, besi bulat, peralatan tulis, oven listrik, termometer, jangka sorong, mikroskop, beaker gelas, dan hand sprayer.

Rancangan lingkungan yang digunakan Rancangan acak lengkap, sedangkan rancangan perlakuan berupa media penyimpanan. Media penyimpanan yang digunakan adalah serbuk gergaji (P₁), *cocopeat* (P₂), arang sekam padi (P₃), dan serbuk arang kayu (P₄). Perlakuan diulang 3 kali sehingga terdapat 12 unit percobaan setiap unit percobaan berisi 40 benih kakao. Penyimpanan benih kakao di ruang dengan suhu rata-rata 26°C dan kelembaban 65%.

Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian diawali dengan mendapatkan buah kakao yang masak untuk diambil bijinya 2/3 bagian (bagian tengah) dengan tujuan mendapatkan ukuran biji yang seragam. Selanjutnya biji sebagai calon benih dibersihkan dari pulpnya menggunakan abu gosok kemudian calon benih direndam sebentar untuk melihat benih yang baik. Benih yang tenggelam di air mengindikasikan calon benih yang baik. Selanjutnya benih ditiriskan dan disortir, sebelum kemudian direndam dengan menggunakan larutan fungisida 0,2% selama 15 menit setelah itu calon benih dikering anginkan.

Persiapan media simpan

Media simpan yang digunakan adalah *cocopeat*, serbuk gergaji, serbuk arang kayu, dan arang sekam padi yang telah di sterilkan dengan menggunakan oven dengan suhu 100°C sekitar 1 jam kemudian di tambah air aquades 50 ml untuk menjaga kelembaban. Selanjutnya media dimasukkan kedalam kardus dengan volume 1 1/2 gelas dengan ketebelan ± 3 cm.

Persiapan Penyimpanan Benih

Benih disimpan menggunakan kardus berukuran 23,5 x 15 x 11 yang diberi ventilasi 8% yang terdiri dari 35 lubang, yang telah diberi media serbuk gergaji, *cocopeat*, serbuk arang kayu, dan arang sekam padi yang sudah disterilkan. Kemudian disimpan 40 benih disetiap media perlakuan dan di letakan di ruangan penyimpanan dengan suhu 24 – 25°C dengan selama 12 hari.

Persiapan Perkecambahan

Sebelumnya media disterilkan kemudian diletakkan di dalam bak tray agar benih dapat langsung dkecambahkan. Untuk pengamatan daya kecambah benih dilakukan perkecambahan biji sebanyak benih yang hidup pada penyimpanan benih.

Peubah yang diamati

Kualitas awal benih, kondisi benih dalam penyimpanan, kualitas benih telah penyimpanan, dan jenis jamur yang tumbuh dalam penyimpanan. Selengkapnya peubah sebagai berikut.

1. Kadar air benih awal dan kadar air media simpan.
2. Kadar air benih setelah penyimpanan dihitung dengan menggunakan rumus

$$KA = \frac{M2-M3}{M2-M1} \times 100\%$$
 Keterangan : KA = kadar air benih , M1 = berat cawan + tutup kosong , M2 = berat cawan + tutup + benih sebelum dipanaskan , M3 = berat cawan + tutup + benih selesai dipanaskan.
3. Persentase benih yang berkecambah dalam penyimpanan dihitung setiap 3 hari sampai hari ke 12.
4. Persentase benih berjamur dalam penyimpanan dihitung mulai hari ke 1 sampai hari ke 12.
5. Identifikasi jamur yang tumbuh saat benih dalam penyimpanan dengan cara mengamati jamur yang menempel pada benih, mengambil spesimennya lalu diamati dengan mikroskop.
6. Persentase daya kecambah setelah penyimpanan

$$\% \text{ Perkecambahan} = \frac{\text{jumlah benih berkecambah normal}}{\text{jumlah benih yang dikecambahkan}} \times 100\%$$
7. Kecepatan berkecambah setelah penyimpanan. Perhitungan menggunakan rumus sebagai berikut : Kecepatan Berkecambah = $\frac{n1}{t1} + \frac{n2}{t2} + \frac{n3}{t3} + \frac{nx}{tx}$
 Keterangan : n adalah Jumlah benih berkecambah Tx, t adalah waktu diperlukan untuk berkecambah, dan x adalah jumlah hari
8. Panjang Kecambah (cm). Pengukuran dilakukan pada kecambah normal hasil pengujian pada umur 7 hari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini, sebelum dilakukan perlakuan pada benih dan media simpan, langkah awal yang dilakukan adalah mengukur kadar air awal benih maka dilakukan penimbangan dan hasil yang di dapat sebesar 49,34%. Perlakuan pada media simpan *cocopeat* menunjukkan persentase kadar air benih setelah penyimpanan tertinggi (63,44 %). Hal ini di duga karena media simpan *cocopeat* mempunyai daya serap yang tinggi, dan menyimpan air dengan baik sehingga kadar air benih setelah penyimpanan pada media serbuk *cocopeat* lebih tinggi. Nilai kadar air media simpan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kadar Air Berbagai Media Simpan Benih Kakao

No.	Peubah	Nilai (%)
1.	Kadar Air Media Serbuk Gergaji (P1)	22,4
2.	Kadar Air Media <i>Cocopeat</i> (P2)	52,2
3.	Kadar Air Media Arang Sekam Padi (P3)	37,2
4.	Kadar Air Media Serbuk Arang Kayu (P4)	31,8
5.	Kadar Air Benih Awal (%)	49,34
6.	Daya Kecambah Awal (%)	100

Tabel 1 menunjukkan bahwa kadar air media *cocopeat* (P2) cenderung lebih tinggi dibandingkan media lain yaitu sebesar 52,2%, dan kadar air media simpan terendah pada media serbuk gergaji (P1) sebesar 22,4%. Sedangkan kadar air pada

media arang sekam padi (P3) dan media serbuk arang kayu sebesar 37,2% dan 31,8%. Kadar air benih awal sebesar 49,34% menunjukkan kondisi kadar air benih yang baik khususnya benih rekalsitran. Begitu pula daya kecambah yang maksimal sebesar 100%. Artinya adalah benih dalam keadaan baik.

Rata-rata benih berjamur 18 persentase daya kecambah, panjang kecambah, dan kecepatan berkecambah setelah penyimpanan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Rerata persentase benih berjamur 1 dalam penyimpanan, persentase daya kecambah, panjang kecambah, dan kecepatan berkecambah setelah penyimpanan

No.	Media Simpan	Peubah			
		Benih Berjamur (%)	Daya Kecambah (%)	Kecepatan Berkecambah (etmal ⁻¹)	Panjang Kecambah (cm)
1.	Serbuk gergaji (P1)	0,85 a	36,27 ab	1,46 ab	4,8 a
2.	Cocopeat (P2)	1,09 a	34,00 ab	0,91 a	4,63 a
3.	Arang sekam padi (P3)	0,92 a	64,20 b	2,1 ab	6,82 b
3	Serbuk arang kayu (P4)	0,79 a	17,50 a	0,63 a	4,01 a

Keterangan : Angka-angka yang diikuti huruf kecil yang sama berbeda tidak nyata pada taraf α 5% uji lanjut DNMRT

Tabel 2 menginformasikan bahwa benih yang disimpan pada media P1, P2, P3 dan P4 memiliki kadar air yang tinggi dan cenderung meningkat dari kadar air awal benih. Hal ini diduga karena suhu di luar kardus terlalu rendah sehingga mengakibatkan terjadinya penekanan kadar air pada benih dan dapat berakibat pada penekanan perkecambahan.

Pada parameter persentase benih berjamur dalam penyimpanan menunjukkan benih yang disimpan dengan media *cocopeat* lebih banyak terserang jamur sebesar (23,17 %) di bandingkan perlakuan lainnya. Hal ini karena tingginya kadar air pada media *cocopeat*, hasil ini dan sejalan dengan pendapat Sutopo (2004) menyatakan bahwa kadar air yang tinggi pada media dapat mengganggu aerasi, mendorong timbulnya penyakit dan benih menjadi busuk akibat cendawan atau bakteri.

Dalam percobaan ini setiap benih berjamur dikeluarkan dari lot, diduga pada saat itu memungkinkan tertinggalnya benang-benang hifa sehingga dapat menyerang benih kakao yang masih dalam penyimpanan dan pada saat pengamatan dan pengambilan benih yang berjamur harus membuka sisi kardus bagian atas, di duga perlakuan pembukaan kardus memungkinkan spora-spora jamur yang ada di udara bebas masuk ke dalam kardus.


Pada parameter panjang kecambah, kecepatan berkecambah dan persentase daya kecambah setelah penyimpanan, perlakuan media arang sekam padi menunjukan hasil yang tertinggi yaitu persentase daya kecambah setelah penyimpanan sebesar (64,20%). Panjang kecambah sebesar (6,28 cm), dan kecepatan berkecambah setelah penyimpanan sebesar (2,1 Etmal), di bandingkan media simpan lainnya. Data ini bermakna perlakuan media arang sekam padi mampu mempertahankan viabilitas benih selama penyimpanan dan dapat menahan laju 23 metabolisme sehingga, masih dapat berkecambah dengan baik setelah penyimpanan. Hal ini sejalan dengan pendapat Syaiful *et.al.* (2007), benih kakao yang disimpan pada media arang sekam mampu mempertahankan daya kecambahnya

sebesar 72,67%. Kelembaban benih tetap terjaga dalam media arang sekam. Kondisi ini terjadi karena sifat kelengasan media arang sekam yang tinggi yakni 9,02%, sifat tersebut mempengaruhi kemampuan sekam untuk mengikat air atau uap air.


Persentase daya kecambah setelah penyimpanan, panjang kecambah, dan kecepatan berkecambah menunjukkan bahwa perlakuan menggunakan media simpan serbuk arang kayu memiliki nilai paling rendah yaitu persentase daya kecambah setelah penyimpanan sebesar (17,50%), panjang kecambah sebesar (4,01cm), dan kecepatan berkecambah setelah penyimpanan sebesar (0,63 etmal⁻¹), hal ini diduga karena serbuk arang kayu banyak mengandung karbon, sehingga daya kecambah dan kecepatan berkecambah relatif lebih rendah dibandingkan dengan perlakuan lainnya.

Pada pengamatan persentase benih yang bekecambah dalam penyimpanan tidak ada benih yang bekecambah hal ini di duga karena suhu ruangan penyimpanan yang rendah. Hal ini sejalan dengan pendapat Lakitan (2004) menyebutkan bahwa penyimpanan pada suhu rendah aktivitas metabolisme didalam benih terhambat. Selain suhu ruang simpan, kelembababan juga mempengaruhi viabilitas benih selama penyimpanan.

Identifikasi secara mikroskopis jamur yang menyerang benih kakao dalam penyimpanan adalah jamur *Aspergillus* spp (Gambar 1 dan 2)



Gambar 1. Jamur yang teridentifikasi *Aspergillus*. Spp (menggunakan mikroskop pembesaran 10 x 40)



Gambar 2. Jamur yang teridentifikasi *Aspergillus* Spp. (menggunakan mikroskop pembesaran 10 x 10)

Pada pengamatan mikroskopis jamur yang menyerang benih dalam penyimpanan adalah jamur *Aspergillus* spp, dengan ciri – ciri adanya hipa-hipa jamur yang berwarna putih disekitar individu benih, beberapa waktu kemudian akan berubah warna hitam, memiliki sekat di didalam setiap hifa, dan membentuk konidia.

KESIMPULAN

Penyimpanan benih kakao pada media Arang sekam padi memberikan pengaruh yang nyata terhadap parameter panjang kecambah dan kecepatan berkecambah setelah

penyimpanan, Penggunaan media simpan serbuk arang kayu tidak dapat mempertahankan viabilitas benih setelah penyimpanan, Selama penyimpanan diketahui jamur yang teridentifikasi adalah jamur *Aspergillus*. spp

DAFTAR PUSTAKA

- 1 Klimchuk, M.R., dan Krasovec, S.A., 2006. Desain Kemasan Perencanaan Me²k Produk yang Berhasil Mulai Dari Konsep Sampai Penjualan. Erlangga. Jakarta
- Kustantini, D dan R. Kusumastuti. 2015. Beberapa Teknik Untuk Meningkatkan Daya Simpan Benih Kakao (*Theobroma cacao* L.). Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP). Surabaya.
- 14 Lakitan, B. 2004. Dasar-Dasar Fisiologi Tumbuhan. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Nengsih, Y. 2018. Teknik Pengemasan Benih Kakao dalam Penyimpanan. Jurnal Media Pertanian. Vol 3(2) : 89-98
- 4 Rahardjo, P. 2011. Menghasilkan Benih dan Bibit Kakao Unggul. Penebar Swadaya. Jakarta
- Rahardjo, P. 2012. Pengaruh Pemberian Abu Sekam Padi Sebagai Bahan Desikan Pada Penyimpanan Benih Terhadap Daya Tumbuh dan Pertumbuhan Bibit Kakao. Jurnal L⁴lita Perkebunan, 28 (2): 93-102.
- Sumampow, F.M.D. 2011. Viabilitas Be²⁸ Kakao (*Theobroma Cacao* L.). Pada Media Simpan Arang Sekam Padi. Jurnal Soil Environment, 8 (3) : 102105
- 6 utopo, L. 2004. Teknologi Benih. Edisi Revisi. Rajawali. Jakarta.
- Syaiful, S. A., M. A. Ishak dan Jusriana. 2007. Viabilitas Benih Kakao (*Theobroma cacao* L.) Pada Berbagai Tingkat Kadar Air Benih dan Media Simpan Benih. Jurnal Agrivigor, 6 (3) : 243-251.
- Winiariyasti. 2015. Pengaruh Serbuk Arang dan Serbuk Kayu Sebagai Media Simpan Terhadap Viabilitas Benih Kakao (*Theobroma cacao* L.). Skripsi. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. ²

Uji Plagiasi Jurnal "Daya Kecambah dan Kekuatan Tumbuh Benih Kakao (*Theobroma cacao* L.) pada Berbagai Media Simpan"

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

jagro.unbari.ac.id

Internet Source

5%

2

repository.unja.ac.id

Internet Source

3%

3

media.neliti.com

Internet Source

2%

4

ejournal2.undip.ac.id

Internet Source

2%

5

blogtaria.blogspot.com

Internet Source

1%

6

jurnal.uma.ac.id

Internet Source

1%

7

documents.mx

Internet Source

1%

8

pengolahanpangan.jurnalpertanianunisapalu.com

Internet Source

1%

9	repo.unand.ac.id Internet Source	1%
10	www.scribd.com Internet Source	1%
11	ojs.uma.ac.id Internet Source	1%
12	Submitted to Politeknik Negeri Jember Student Paper	1%
13	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1%
14	jurnal.una.ac.id Internet Source	<1%
15	text-id.123dok.com Internet Source	<1%
16	es.scribd.com Internet Source	<1%
17	faperta.uho.ac.id Internet Source	<1%
18	repository.warmadewa.ac.id Internet Source	<1%
19	docplayer.info Internet Source	<1%
20	tabloidsinartani.com Internet Source	

<1%

21

hfatchurohman.blogspot.com

Internet Source

<1%

22

Hisworo Ramdani, Arifah Rahayu, Haris Setiawan. "Increasing of Production and Quality of Cherry Tomato (*Solanum lycopersicum* var. *cerasiforme*) through Used of Various Growth Medium Compositions and SP-36 Fertilizer Dosages", JURNAL AGRONIDA, 2019

Publication

<1%

23

zombiedoc.com

Internet Source

<1%

24

jurnal.uns.ac.id

Internet Source

<1%

25

www.forumkakaooaceh.or.id

Internet Source

<1%

26

Heri Suryanto. "PENGARUH BEBERAPA PERLAKUAN PENYIMPANAN TERHADAP PERKECAMBAHAN BENIH SUREN (*Toona sureni*)", Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea, 2013

Publication

<1%

27

www.safe-a-rooni.org

Internet Source

<1%

28

Indah Anita-Sari, Bayu Setyawan, Agung Wahyu Susilo. "Germination and Water Content of Cocoa Seeds After Storage Treatments", Pelita Perkebunan (a Coffee and Cocoa Research Journal), 2018

Publication

<1%

29

Siti Suleho Batubara, John Nefri, Nofrianil. "Analisis Pengaruh Pelapisan Benih dengan Bahan Desikan dan Lama Penyimpanan Terhadap Kualitas Benih Kakao (Theobroma Cacao L.) di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, Jember", Agroteknika, 2018

Publication

<1%

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On